

	Monoterminal	Biterminal	Opmerkingen
Abcesholten openen	-	mes; S-effect 1	o.a. bij deroofing
Acrochordon (skin tag)	D, F	bol; C-soft, C-forced	of lus; S-effect 2
Actinische keratose	F superficial / low power	bol; C-forced superficial / low power	cryotherapie heeft de voorkeur
Adenoma sebaceum	D low power	bol; C-soft low power	
Angiokeratoma	D superficial	bol; C-soft, C-forced	
Angiofibroma	D diep	bol; C-soft, diep	
Angioma, capillair	D, F superficial	bol; C-forced, C-soft	
Angioma, cavernous	D	bol; C-forced, C-soft	dichtdrukken met bol, dan coaguleren
Angioma, senile	D	kleine bol; C-forced, C-soft	dichtdrukken met bol, dan kort stroomstootje
Basaalcelcarcinoom	F + curettage	bol; C-forced + curettage, diep	curettage plus coaguleren bodem en randen
Besenreiser	naald; D low power	naald; C-soft low power	speciale besenreiser naalden, alternatief: laser
Bowen	F	bol; C-forced	cryotherapie of excisie heeft de voorkeur
Bowenoide papulose	F	bol; C-forced	
Condyloma acuminatum	F, D	bol; C-forced, C-soft	of lus; S-effect 2
Dermatosis papulosa nigra	D superficial	bol; C-soft, C-forced superficial	verdoven met EMLA, heel oppervlakkig aanstippen
Epidermale nevus	D superficial	bol; C-soft, C-forced superficial	plus mechanisch verwijderen met ruw gaas na coagulatie
Fibroma	D, F superficial / low power	bol; C-soft, C-forced superficial	
Granuloma pyogenicum	F, D	bol; C-forced, C-soft	alternatief: excideren
Hemostase	-	bol; C-forced, C-soft	of bipolar pincet
Hypergranulatie weefsel	-	bol of lus; C-forced	ook bij ingegroeide teennagel
Kaposi sarcoom	D, F	bol; C-soft, C-forced	alleen bij kleine lesies
Keratoacanthoma	F + curettage	bol; C-forced + curettage	alleen voor nacoaguleren na curettage; of lus; S-effect 2
Keloid	-	mes; S-effect 1	tangentiële excisie
Lentigo senilis	D superficial	bol; C-soft, C-forced superficial	plus mechanisch verwijderen met ruw gaas na coagulatie
Lymphangioma	D, F		
Molluscum contagiosum	D	bol; C-soft	
Naevus naevocellularis	D superficial	bol; C-soft, C-forced superficial	plus mechanisch verwijderen met ruw gaas na coagulatie; alleen bij epidermale
Plaveiselcelcarcinoom	F + curettage	bol; C-forced + curettage	chirurgie heeft de voorkeur
Rhinophyma	-	lus of mes; S-effect 2	plus coaguleren bloedvaten met bol; C-forced, C-soft
Spider naevus	naald; D low power	naald; C-soft low power	centrale vat dichtbranden
Syringoma	F, D	kleine bol; C-forced	
Talgklierhyperplasie	F, D	kleine bol; C-forced	
Teleangiectasien	naald; D low power	naald; C-soft low power	speciale dunne naalden; alternatief: laser
Trichoepithelioma	F, D	kleine bol; C-forced	
Verruca filiformis	D, F van de basis	bol; C-forced	lus; S-effect 2, diep
Verrucae planae	F superficial / low power	bol; C-forced superficial / low power	verdoven met EMLA, heel oppervlakkig aanstippen
Verrucae vulgaris	D, F + curettage	bol; C-forced, C-soft	plus mechanisch verwijderen gecoaguleerd weefsel (curette, mes, schaar, ruw gaas)
Verruca plantaris	D, F + curettage	bol; C-forced, C-soft, diep lus of bol: S-effect 2, diep	plus mechanisch verwijderen gecoaguleerd weefsel (curette, mes, schaar, ruw gaas)
Verrucae seborroica	F superficial	bol; C-forced superficial	plus mechanisch verwijderen met ruw gaas na coagulatie
Xanthelasmata	D superficial	bol; C-soft, C-forced superficial	plus mechanisch verwijderen met ruw gaas na coagulatie
D Electrodessicatie	verdamping van het weefsel, kan diep doordringen, weinig coagulatie. Vergelijkbaar met biterminal electrocoagulatie in soft modus. De duur van het contact en het ingestelde vermogen bepaalt de diepte van het effect.		
F Electrofulguratie	zeer oppervlakkige destructie en coagulatie. Vergelijkbaar met biterminal electrocoagulatie in forced modus, met een laag vermogen en heel oppervlakkig en kortdurend aanstippen.		
C-soft Coagulatie	in soft modus: diep doordringend coagulatie en hitte effect, weinig carbonisatie.		
C-forced Coagulatie	in forced modus: geforceerde coagulatie met carbonisatie.		
S-effect 1	Snijden.		
S-effect 2	Snijden en tegelijkertijd coaguleren.		