

Preventieve antibiotica bij chirurgische ingrepen

Antibiotica postoperatief kunnen worden overwogen in de volgende situaties :

- alle vrije transplantaten (full thickness skingrafts)
- verschuivingsplastieken in het gelaat
- ingrepen aan de neus en aan het oor
- ingrepen in oksels, liezen en perineum
- ingrepen onder de knie
- ingrepen bij immuunsuppressie, met name grotere ingrepen
(alles moeilijker dan een kleine ovaal en langer dan een half uur durend)
- alles wat wordt opengelaten in afwachting van PA
- geïnfecteerde laesies of infecties in de nabijheid van de wond
- voorgeschiedenis van wondinfectie
- twijfel over de steriliteit van de uitgevoerde procedure
- niet goed aansluitende wondranden,
- kans op ischemie door b.v. veel aangebrachte (bloedstelpende) hechtingen

Antibiotica

R/ Floxapen (flucloxacilline) 4 dd 500 mg of 3 dd 1000 mg

R/ Augmentin (amoxicilline/clavulaanzuur) 3 dd 625 mg
(voorkeur bij liezen, oksels, perineum, oren en neus)

Bij penicilline allergie

R/ Clindamycine 3 dd 600 mg

R/ Klacid 1 dd 500 mg SR of 2 dd 250 mg

R/ Azitromycine 1 dd 250 mg